Der Typhus in Helgoland im Jahre 1895.

Von

J. J. Reincke
in Hamburg.

In Ergänzung der Arbeit von Mewius: [1] „Beitrag zur Verbreitungsweise des Typhus abdominalis", in welcher er eine Typhusepidemie auf Helgoland im Jahre 1895 schildert, möchte ich darauf aufmerksam machen, dass gleichzeitig in Cuxhaven, dem nächst gelegenen Punkte am Festlande, mit dem ein reger Personenverkehr besteht und von wo Helgoland sehr viele Lebensmittel bezieht, eine heftige Typhusepidemie herrschte, die bis in das Jahr 1894 zurückreichte.

Es erkrankten an Typhus:

	in Cuxhaven	in Helgoland
Juni 1896	9	—
Juli	14	—
August	11	16
September	23	14
October	14	8
November	12	—
December	2	3
Januar 1897	3	1

Dieser Parallelismus beider Epidemieen lässt annehmen, dass Helgoland seinen Typhus aus Cuxhaven bezogen hat, womit natürlich nicht ausgeschlossen ist, dass auch in Helgoland selbst weitere directe und indirecte Uebertragungen stattgefunden haben.

[1] *Diese Zeitschrift.* Bd. XXIII. S. 497.

Meine Annahme wird unterstützt durch die Angabe von Mewius, dass Helgoland auch 1886 und 1887 mehr Typhus als gewöhnlich hatte; denn es waren dies die Jahre der grossen Typhusepidemieen in Hamburg, das mit Helgoland in noch engerem Verkehr steht als Cuxhaven.

Jetzt ist Hamburg durch seine bessere Wasserversorgung von Typhus fast befreit und Cuxhaven kann dasselbe hoffen, wenn im Sommer dieses Jahres das Wasserwerk und die Canalisation vollendet sein werden. Dadurch wird auch Helgoland eine sehr viel grössere Sicherheit gegen den Typhus erlangen als bisher.